

# GOLDENE REGELN

FÜR WIRKSAMEN SCHUTZ GEGEN ZECKEN,  
FLÖHE UND FLIEGENDE INSEKTEN

# FRONTLINE

TRI-ACT® FÜR  
HUNDE



## ALLE TIERE IM HAUSHALT BEHANDELN!

Denn unbehandelte Tiere können die anderen immer wieder neu anstecken.

FRONTLINE TRI-ACT® wurde exklusiv für Hunde entwickelt – für Katzen eignet sich FRONTLINE® SPOT ON.



## AUF DIE RICHTIGE PIPETTENGRÖSSE ACHTEN!

Bei zu geringer Dosierung kann der Behandlungserfolg beeinträchtigt werden.

FRONTLINE TRI-ACT® gibt es für Hunde in 5 Pipettengrößen – für ganz kleine bis ganz große Hunde.



## FRONTLINE® RICHTIG AUFTRAGEN!

Nur wenn die Lösung vollständig auf die Haut aufgetragen wird, kann sie ihre langanhaltende Wirkung entfalten.

Die Spot On-Formulierung von FRONTLINE TRI-ACT® macht die Anwendung besonders leicht.



## DAS TIER 48 STUNDEN VOR UND NACH DER BEHANDLUNG NICHT BADEN!

Die natürliche Hautbeschaffenheit ist die optimale Basis für die Verteilung der Wirkstofflösung.

Baden vor oder nach der Behandlung kann die Verteilung beeinträchtigen – Regen macht nichts aus.

Nach der Verteilungszeit ist FRONTLINE TRI-ACT® wasserfest.



## DAS RICHTIGE BEHANDLUNGSINTERVALL EINHALTEN!

Nur wenn kontinuierlich ausreichend Wirkstoff vorhanden ist, kann eine Wirkung ohne Schutzlücke ermöglicht werden.

FRONTLINE TRI-ACT® ist sehr gut verträglich und sollte monatlich angewendet werden.



## DIE BEHANDLUNGSDAUER AN DIE LEBENSUMSTÄNDE DES TIERES ANPASSEN!

Zecken sind in den wärmeren Monaten aktiv – und Flöhe haben ganzjährig Saison.

Die Behandlung kann saisonal konzentriert oder auch ganzjährig erfolgen. Bei bestehendem Flohbefall kann die Behandlungsdauer zwischen zwei und vier Monaten in Anspruch nehmen.

FRONTLINE TRI-ACT® kann dauerhaft schützen – denn Prophylaxe ist immer noch der beste Schutz!

# GOLDENE REGELN

# FRONTLINE

TRI-ACT<sup>®</sup> FÜR  
HUNDE

**Frontline Tri-Act**, Lösung zum Auftropfen für Hunde 2-5 kg, 5-10 kg, 10-20 kg, 20-40 kg, 40-60 kg, Wirkstoffe: Fipronil, Permethrin.  
**Anwendungsgebiete:** Zur Behandlung u. Vorbeugung eines Floh- u./o. Zeckenbefalls, wenn gleichzeitig eine repellierende Wirkung (Verhinderung der Blutaufnahme) gegen Sandmücken, Stechfliegen u./o. Stechmücken angezeigt ist. **Flöhe:** Behandlung u. Vorbeugung eines Flohbefalls mit *Ctenocephalides felis* u. Vorbeugung eines Flohbefalls mit *Ctenocephalides. canis*. Eine Behandlung verhindert einen erneuten Flohbefall für 4 Wochen. Das Tierarzneimittel kann als Teil einer Behandlungsstrategie gegen Flohallergiedermatitis verwendet werden, sofern dies zuvor durch einen Tierarzt diagnostiziert wurde. **Zecken:** Behandlung u. Vorbeugung eines Zeckenbefalls (*Dermacentor reticulatus*, *Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*). Die Behandlung tötet Zecken ab (*D. reticulatus*, *I. ricinus*, *R. sanguineus*) u. wirkt repellierend gegen Zecken (*I. ricinus*, *R. sanguineus*) für 4 Wochen nach der Behandlung. Die repellierende Wirksamkeit gegen *D. reticulatus* beginnt am Tag 7 nach der Behandlung u. hält für bis zu 4 Wochen an. **Stech- u. Sandmücken:** Wirkt repellierend gegen Sandmücken (*Phlebotomus perniciosus*) für 3 Wochen u. gegen Stechmücken (*Culex pipiens*, *Aedes albopictus*) für 4 Wochen. Tötet Sandmücken (*P. perniciosus*) u. Stechmücken (*A. albopictus*) für 3 Wochen ab. Verringerung des Risikos einer Infektion mit *Leishmania infantum* für bis zu 4 Wochen. Die Wirkung beruht auf einer indirekten Wirksamkeit des Tierarzneimittels gg. den Vektor. **Stechfliegen:** Repelliert u. tötet die gemeine Stechfliege (*Stomoxys calcitrans*) für 5 Wochen. [DE: Mai 2020]

**Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Tierarzt oder Apotheker.**

# GOLDENE REGELN