

# FRONTLINE®

Die Nr.1<sup>1</sup> gegen Zecken & Flöhe



MIT HUND &  
KATZE AUF  
REISEN



## CHECKLISTE FÜR EINEN TIERISCHEN URLAUB

[frontline.de](http://frontline.de)

## Wichtige Überlegungen vor der Reise



- Hat auch das **Tier** etwas davon?
- Abwägung Reisedauer / Reisedress – **Aufenthaltsdauer**
- Mögliche Ansteckung mit „**Reisekrankheiten**“  
(z. B. in südlichen Ländern mit Leishmaniose, Babesiose, Ehrlichiose)

## Sind alle Formalitäten erledigt?



- Einreisebestimmungen** gecheckt und erfüllt?
- Heimtierausweis** und Impfungen auf dem Laufenden?
- Wenn möglich Adressen und Telefonnummern von **Deutsch** oder ggf. **Englisch** sprechenden Tierärzten am Zielort (Tourismusverband) heraussuchen.

## Verreisen mit dem Auto



- Ausreichend **frisches Wasser** mitnehmen und Napf bereitstellen
- Hund nur **gesichert transportieren** (Hundebox oder anschnallen)
- Tiere erst am Zielort und in **gesicherter Umgebung** wieder aus der Box lassen!

## Verreisen mit dem Flugzeug



- Möglichst **Nonstop-Flüge** buchen
- Transportbox entsprechend der **Anforderungen der Fluggesellschaft** und Größe des Tieres (Kabine oder Frachtraum)
- Gewöhnung** an die Transportbox
- Saugfähige, weiche Unterlage in der Box, **rutschfest** fixieren
- Vermerk mit **Besitzer-Anschrift / -Telefonnummer und Reiseziel**, Name des Tieres an die Box kleben, Adress-Anhänger am Halsband befestigen
- Anstatt Wasser **Eiswürfel** in den Napf geben, diese tauen dann nach und nach auf
- Transportpapiere** und **Kopie des EU-Heimtierausweises** an der Box anbringen

- Bei Bedarf **Einfuhrpapiere** mitnehmen (Tollwutantikörperuntersuchung, Einreisegenehmigung etc.)
- Wenn nötig **Abstammungsnachweis** bei einigen Rassen / Ländern mitnehmen (Stichwort „Kampfhunde“)

## Reiseapotheke mitnehmen



- Parasitenprophylaxe (z. B. FRONTLINE®)
- Evtl. Beruhigungsmittel (nur nach Absprache mit dem Tierarzt!)
- Verbandsmaterial, Schere, Kompressen
- Desinfektionsmittel / Wundsalbe
- Magen-Darm-Mittel, nur nach Absprache mit dem Tierarzt (Durchfall / Erbrechen)
- Zeckenhaken
- Bei bekannten Vorerkrankungen ausreichend Medikamente

## Hundegepäck einpacken



- Saubere Transportbox (Gewöhnung des Tieres vorausgesetzt)
- Sauberes, weiches Lager
- Eigene Näpfe
- Genügend gewohntes Futter
- Ausreichend frisches Wasser
- Leine (evtl. Ersatzleine mitnehmen), bei Bedarf Maulkorb
- Trockenshampoo (z.B. FRONTLINE PET CARE Reinigender Schaum 2 in 1) und Handtücher
- Leckerlis, Kauknochen
- Hunde-Spielzeug, Kamm, Bürste
- Ausreichend Kotbeutel





## Wichtig:



- Überhitzung** vermeiden (Tiere nicht im parkenden Auto lassen, Schatten wandert, möglichst nicht in der Mittagshitze unterwegs sein)
- Zugluft** meiden
- Ausreichend **Wasser** anbieten
- An unbekanntem Plätzen **anleinen**
- Kontakt mit **fremden Artgenossen meiden** (Gefahr der Krankheitsübertragung)

Vermeiden Sie  
**Stress** bei Ihrem Tier  
in **ungewohnten**  
Situationen!

<sup>1</sup> In der Apotheke / IMS Health YTD 12/2017.

**Frontline Spot on Hund S, M, L**, Lösung zum Auftropfen auf die Haut, für Hunde. **Frontline Spot on Katze**, Lösung zum Auftropfen auf die Haut, für Katzen. Wirkstoff: Fipronil. **Anwendungsgebiete:** **Hund:** Zur Behandlung von Hunden mit einem Körpergewicht von 2 kg bis 10 kg (S), über 10 kg bis 20 kg (M), über 20 kg bis 40 kg (L) gegen Floh-, Zecken- und Haarlingsbefall. Abtötung von Flöhen (Ctenocephalides spp.) **Katze:** Zur Behandlung von Katzen gegen Floh-, Zecken- und Haarlingsbefall. Abtötung von Flöhen (Ctenocephalides spp.). Die insektizide Wirksamkeit gegen adulte Flöhe bleibt 8 Wochen (**Hund**) bzw. 4 Wochen (**Katze**) lang erhalten. Abtötung von Zecken (Ixodes ricinus, Dermacentor variabilis, Rhipicephalus sanguineus). Die akarizide Wirksamkeit gegen Zecken hält bis zu 4 Wochen (**Hund**) bzw. 2 Wochen (**Katze**, gemäß experimenteller Untersuchungen) an. Abtötung von Haarlingen (**Hund:** Trichodectes canis, **Katze:** Felicola subrostratus). Zur Behandlung und Kontrolle der Flohstichallergie (Flohstichallergiedermatitis = FAD). [Okt 2017]

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie den Tierarzt oder Apotheker.